

Cupressaceae

1. Características



Porte: árboles o arbustos monoicos o dioicos.


Hojas: simples, opuestas o verticiladas, a veces lineares cuando jóvenes y escuamiformes en plantas adultas.



Estructuras reproductivas: **Estróbilos microsporangados:** amentiformes, terminales, compuestos de numerosos microsporofilos opuestos o verticilados, llevando 2-6 sacos polínicos cada uno. **Estróbilos megasporangados:** globosos-ovoides, formados por numerosas escamas peltadas o basifijas, valvadas o imbricadas, todas fértiles o parcialmente estériles, con uno o más óvulos cada una. Conos maduros leñosos o carnosos, de maduración anual o bienal, con las escamas provistas a veces de apéndice dorsal. Semillas aladas o ápteras.

Rama con hojas

Cono microsporangado



2. Distribución: familia con 19 géneros y cerca de 48 especies. Se encuentra distribuida en regiones templadas o templado-cálidas de ambos hemisferios, pero más abundantemente en el hemisferio norte. En Argentina se encuentran tres géneros monotípicos que viven en los bosques patagónicos: *Austrocedrus chilensis* (ciprés), *Fitzroya cupressoides* (alerce) y *Pilgerodendron uviferum* (ten).

3. Clave para identificar los géneros nativos de Cupressaceae (Covas, 1995)

A. Hojas y esporofilos en verticilos trímeros. Semillas con dos alas aproximadamente iguales.

Fitzroya

A'. Hojas y esporofilos opuestos, decusados. Semillas con dos alas desiguales.

- B. Hojas heteromorfas, opuestas, decusadas, cubriendo totalmente los r mulo, las laterales mayores que las antero-posteriores.

Austrocedrus

- B'. Hojas isomorfas, dando aspecto tetr stico a los r mulo.

Pilgerodendron

Especies Nativas	Nombre vulgar	Especies Ex�ticas	Nombre vulgar
<i>Fitzroya cupressoides</i> (Fig. 1)	alerce	<i>Thuja occidentalis</i> (Fig. 4)	tuja
<i>Austrocedrus chilensis</i> (Fig. 2)	cipr�s de la cordillera	<i>Thuja orientalis</i> (Fig. 5)	tuja
<i>Pilgerodendron uviferum</i> (Fig. 3)	ten, cipr�s de los Guaitecas, len	<i>Cupressus sempervirens</i> (Fig. 6)	cipr�s
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (Fig. 7)	cipr�s de Lawson

✚ ***Fitzroya cupressoides* (Molina) I. M. Johnst.**

En Argentina vive desde el N del Nahuel Huapi (39 ) hasta las cercan as de los lagos situados entre 42 43'S. Prefiere terrenos poco profundos, pobres, h midos y pantanosos. Vive mezclados con coihue (*Nothofagus dombeyi*) y con mani  (*Saxegothaea conspicua*) y otras especies.

La madera es de excelente calidad. Es liviana de color rojizo, imputrescible, no la atacan los insectos. Se emplea para la fabricaci n de tejuelas, puertas, ventanas, toneles, construcci n de embarcaciones y postes. La "estopa de alerce" es una capa fibrosa impregnada de resina que se encuentra bajo la corteza y es utilizado para el calafateo de embarcaciones. El nombre gen rico *Fitzroya* fue puesto en honor al capit n Fitz-Roy del Beagle, a bordo del cual Darwin realiz  su viaje alrededor del mundo.

✚ ***Austrocedrus chilensis* (D. Don) Pic. Serm. & Bizarri**

Se distribuye geogr ficamente en Argentina y Chile desde los 30  y los 44  S hasta los 2000 m s.n.m. Crece en lugares pedregosos y erosionados. Son los primeros  rboles que aparecen cuando se avanza desde la llanura  rida hacia el oeste y corresponden al elemento predominante en la regi n del Parque Nacional "Nahuel Huapi".

Produce una madera blanco-amarillenta, de mediana calidad por los m ltiples nudos que presenta. Es resistente, durable, liviana, arom tica y se la utiliza en carpinter a, muebler a, en la fabricaci n de postes y pilares de muebles (por su resistencia a la intemperie y a la humedad).

✚ ***Pilgerodendron uviferum* (D. Don) Florin**

Es la con fera m s austral, vive en los bosques andinos, desde los 40 S hasta Tierra del Fuego e Isla de los Estados. Crece en lugares pantanosos anegadizos o turbosos de *Sphagnum*. La madera es de excelente calidad, imputrescible, liviana y se la utiliza para embarcaciones, muelles, postes, etc.

✚ ***Thuja* sp. (tuya)**

Distribuida en el este y sudoeste de Canad  y el este de EE.UU. Cultivada como ornamental y forestal, de buen crecimiento en el sur de Buenos Aires, Neuqu n y R o Negro.

La madera de las tuyas es muy maciza. Se utiliza en ebanister a y carpinter a. Cultivada para cercos vivos y en jardines, parques, especialmente en cementerios. Adem s de las formas de desarrollo t pico hay tambi n algunas razas de crecimiento enano para jardiner a.

De *Thuja occidentalis* se extrae el aceite de cedro empleado como aceite de inmersi n en microscop a.

✚ ***Juniperus* sp.**

El aceite extra do de la semilla es utilizado para saborizar la ginebra.

✚ ***Cupressus sempervirens* L. (cipr s)**

Crece normalmente en suelos profundos y medianamente sueltos, de humedad media. Se desarrolla mejor en climas templado-cálidos.

Originaria del este y sur de la cuenca del Mediterráneo. En Argentina se cultiva como ornamental.

El nombre del género *Cupressus*, recuerda una leyenda griega donde se relata la historia de "Kuparissos" quien se convirtió en un ciprés; el específico *sempervirens*, lo debe a su follaje siempre verde (Leonardis, 2000).

Especies nativas de la familia Cupressaceae



Fig. 1. *Fitzroya cupressoides*



Fig. 2. *Austrocedrus chilensis*



Fig. 3. *Pilgerodendron uviferum*

Especies exóticas de la familia Cupressaceae

Fig. 4: *Thuja occidentalis*

Fig. 5: *Thuja orientalis*



a. Porte



a. Porte



**b. Conos megasporangios
jóvenes**



a. Porte


Fig. 6: Cupressus sempervirens



b. Conos megasporangios maduros



c. Conos microsporangios



a. Conos microsporangios

b. Conos megasporangios maduros

Fig. 7: Chamaecyparis lawsoniana

